


## Deux suites finies des nombres à la fois triangulaires et pyramidaux

triangulaires et pyramidaux à base carrée.

La suite A039596 de l'encyclopédie en ligne OEIS donne la liste des nombres qui sont à la fois triangulaires et pyramidaux : 1, 55, 91, 208335.

Nous nous proposons de les retrouver.

On peut immédiatement penser que le nombre triangulaire général  $T(n)$  correspond à une surface et est un polynôme en  $n$  de degré 2 tandis que le nombre pyramidal  $P(m)$  qui correspond à un volume, est un polynôme de degré 3 en  $m$ . Ce qui fait qu'en égalisant on obtiendra une équation d'une courbe elliptique.



La suite ( $T$ ) des nombres triangulaires est  $T = 0, 1, 3, 6, 10, \dots$  de terme général  $T(n) = \sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$  et la suite ( $P$ ) des nombres pyramidaux est

$P = 0, 1, 5, 14, 30, \dots$  de terme général  $P(n) = \sum_{k=0}^n k^2 = \frac{n}{6}(n+1)(2n+1)$ .

L'équation à résoudre en  $n$  et en  $m$  est  $T(n) = P(m)$ .

$$\begin{aligned}
 T(n) &= P(m) \\
 \frac{n(n+1)}{2} &= \frac{m}{6}(m+1)(2m+1) \\
 3(2n)(2n+2) &= 2m(2m+2)(2m+1) \\
 3(Y-1)(Y+1) &= (X-1)X(X+1) \\
 3Y^2 - 3 &= X^3 - X \\
 81Y^2 &= 27X^3 - 27X + 81 \\
 y^2 &= x^3 - 9x + 81
 \end{aligned}$$

Une première mise en forme a pour but de préparer l'utilisation de l'identité remarquable  $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$ .

Le changement de variables  $Y = 2n + 1$ ,  $X = 2m + 1$  aide à simplifier les calculs et nous conduit à effectuer un second changement de variables  $y = 9Y$  et  $x = 3X$  qui nous donne finalement une équation de Weierstrass de la forme  $y^2 = x^3 + ax + b$ .

Si  $m$  et  $n$  sont entiers, alors  $x = 3(2m + 1)$  et  $y = 9(2n + 1)$  le sont aussi, comme  $m = \frac{x-3}{6}$  et  $n = \frac{y-9}{18}$ , la réciproque n'est pas nécessairement toujours vraie, les valeurs de  $m$  et  $n$  obtenues sont rationnelles mais a priori rien ne garantit qu'elles soient entières ou même positives.

L'ensemble des solutions de  $T(n) = P(m)$  (1) est donc l'ensemble des couples de deux nombres entiers positifs  $n$  et  $m$  obtenus à partir des solutions entières de  $y^2 = x^3 - 9x + 81$  (2).

Les solutions de (2) se trouvent dans les tables de Cremona, on peut aussi les déterminer à l'aide d'un logiciel de théorie des nombres, celui-ci est `mwrnk`, intégré dans `sage`. En voici l'exécution :

```
jp@abc:~$ sage
-----
| Sage Version 4.0.1, Release Date: 2009-06-06                |
| Type notebook() for the GUI, and license() for information. |
-----
E=EllipticCurve([0,0,0,-9,81]);
F=E.minimal_model();
p=F.S_integral_points([2,3]);
A=F.isomorphism_to(E);
q=[A(P) for P in p];
s=[((x-3)/6 ,(y-9)/18) for (x,y,z) in q];
s=[(x,y) for (x,y) in s if x.is_integral() and y.is_integral()];
s
sage: E=EllipticCurve([0,0,0,-9,81]);
sage: F=E.minimal_model();
sage: p=F.S_integral_points([2,3]);
sage: A=F.isomorphism_to(E);
sage: q=[A(P) for P in p];
sage: s=[((x-3)/6 ,(y-9)/18) for (x,y,z) in q];
sage: s=[(x,y) for (x,y) in s if x.is_integral() and y.is_integral()];
sage: s
[(-1, 0), (0, 0), (1, 1), (5, 10), (6, 13), (85, 645)]
sage:
```

Il ne reste plus qu'à calculer  $T(0) = 0$ ,  $T(1) = 1$ ,  $T(10) = 55$ ,  $T(13) = 91$ ,  $T(85) = 208335$  pour obtenir le résultat.

NB. En France l'usage veut que 0 soit le plus petit entier positif (et non 1), on préférera sans doute faire débiter la suite par  $T(0)$  et non par  $T(1)$ .


## Nombres à la fois triangulaires et tétraédraux.

Les nombres triangulaires sont décrits au paragraphe précédent. Les nombres tétraédraux ou pyramidaux à base triangulaire sont les sommes des nombres triangulaires.

La suite ( $T$ ) des nombres triangulaires est  $T = 0, 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45 \dots$

de terme général  $T(n) = \sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$  et la suite ( $H$ ) des nombres tétraédraux est  $H = 0, 1, 4, 10, 25, 46, 74, 110, 155 \dots$  de terme général  $H(n) =$

$$\sum_{k=0}^n \frac{k(k+1)}{2} = \frac{n(n+1)(n+2)}{6}.$$



*Nombres triangulaires et nombres tétraédraux*

L'équation à résoudre en  $n$  et en  $m$  est cette fois  $T(n) = H(m)$ .

$$\begin{aligned} T(n) &= H(m) \\ \frac{n(n+1)}{2} &= \frac{m(m+1)(m+2)}{6} \\ 3(2n)(2n+2) &= 4(m)(m+1)(m+2) \\ 3(Y-1)(Y+1) &= 4(X-1)X(X+1) \\ 3(Y^2-1) &= 4(X^3-X) \\ 81 \times 16(Y^2-1) &= 27 \times 64(X^3-X) \\ 36^2 Y^2 - 36^2 &= 12^3 X^3 - 12^3 X \\ (36Y)^2 &= (12X)^3 - 12^2(12X) + 36^2 \\ y^2 &= x^3 - 144x + 1296 \end{aligned}$$

Les changements de variables sont d'abord  $Y = 2n+1$ ,  $X = m+1$  puis  $y = 36Y$ ,  
 $x = 12X$ .

Finalement  $y = 36(2n + 1)$ ,  $x = 12(m + 1)$  et inversement  $n = \frac{y}{72} - \frac{1}{2}$ ,  
 $m = \frac{x}{12} - 1$ .

Le script correspondant à ce problème des nombres triangulaires et tétraédraux, à exécuter dans Sage est

```
E=EllipticCurve([0,0,0,-144,16*81]);
F=E.minimal_model();
p=F.S_integral_points([2,3]);
A=F.isomorphism_to(E);
q=[A(P) for P in p];
s=[((x-12)/12 ,(y-36)/72) for (x,y,z) in q];
s=[(x,y) for (x,y) in s if x.is_integral() and y.is_integral()];
s
```

Les solutions obtenues à ce moment sont

```
[(-2, 0), (-1, 0), (0, 0), (1, 1), (3, 4), (8, 15), (20, 55), (34, 119)]
```

Les nombres sont  $H(0) = T(0) = 0$ ,  $H(1) = T(1) = 1$ ,  $H(3) = T(4) = 10$ ,  
 $H(8) = T(15) = 120$ ,  $H(20) = T(55) = 1540$  et  $H(34) = T(119) = 7140$

Déc. 2009, et mars 2010 Jean-Paul Davalan — jeux et mathématiques —

<http://linenn.davalan.eu/pdf/pyram.pdf>

<http://jeux-et-mathematiques.davalan.org/mots/suites/weierstrass/pyram.pdf>